Protección Entérica PORCINA

Enterisol®
Ileitis

Reg. SAGARPA B-0171-020

Vacuna viva oral contra
Lawsonia intracellularis,

FÓRMULA:
Contiene cultivo vivo avirulento liofilizado de *Lawsonia intracellularis*, cepa B3903.

INDICACIONES:
Recomendado para la vacunación de cerdos sanos susceptibles de 3 semanas de edad o mayores como ayuda en la prevención y control de la Enteropatia proliferativa porcina (ileitis) en su forma clínica y subclínica causada por *Lawsonia intracellularis*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Administrar 1 dosis en agua de bebida en cerdos de 3 semanas de edad o mayores, consultar el instructivo para mayor información.
Vía: oral, en agua de bebida.

ADVERTENCIAS:
- Vacune sólo animales sanos.
- Manténgase entre 2° y 7° C, protegido de la luz solar directa.
- Evite su congelación.
- Agite el frasco antes de usar.
- Utilice todo el contenido una vez abierto el frasco.
- No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- Incinere el frasco vacío.
- No usar en hembras gestantes ni sementales.
- No use este producto junto con antibióticos.
- Retire el uso de antibióticos en el agua y/o en el alimento. tres días antes y tres días después de la vacunación.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- En caso de reacciones anafilácticas utilice epinefrina como antídoto.

PRESENTACIÓN:
Frasco de 100 ml (50 dosis).

Consulte al Médico Veterinario.

"Apague la bomba de tiempo".

BIOLÓGICOS

Boehringer Ingelheim