

Ingelvac 3FLEX®

Reg. SAGARPA B-0171-011



Es la única vacuna triple, de dosis única autorizada por el USDA para uso en cerdos para controlar Circovirus porcino tipo 2 (PCV2), Mycoplasma hyopneumoniae y el Síndrome Reproductivo y Respiratorio Porcino (PRRS). Provee la habilidad adicional de personalizar un programa de control de enfermedad cuando las tres enfermedades están presentes. No hay ninguna interferencia entre los Ags individuales cuando se administran en una sola inyección.

FÓRMULA:

Contiene PCV2 inactivado en vector de baculovirus, cultivos químicamente inactivados de M.Hyo y virus vivo modificado de PRRS cepa ATCC-VR-2332 (Cepa Norteamericana). Es parte de la familia de vacunas FLEX™ de BIAH y contiene el exclusivo adyuvante de polímero de base acuosa ImpranFLEX® para una respuesta inmune fuerte y prolongada.

INDICACIONES:

3FLEX® es fácil de mezclar y se administra en una sola inyección de 2 ml a cerdos sanos susceptibles de 3 semanas de edad o más, proporcionando una protección eficaz contra la enfermedades clínicas asociadas con PCV2, M. hyo y PRRS, reduciendo mano de obra y el estrés de inyectar cerdos en múltiples ocasiones.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Dosis única de 2 ml

Vía de administración: intramuscular

ADVERTENCIAS:

- Vacune solo animales sanos
- Conserve en refrigeración entre 2° y 7° C protegido de la luz solar directa.
- Evite su congelación.
- Agite el frasco antes de usar.
- Utilice todo el contenido una vez abierto el frasco.
- No vacunar 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- En caso de reacciones anafilácticas, utilice epinefrina como antídoto.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 100 ml de producto preparado (50 dosis). Cada paquete 3FLEX® contiene una botella de Ingelvac CircoFLEX®, una botella de Ingelvac MycoFLEX® (HSB) y una botella de Ingelvac PRRS® MLV liofilizado

MODO DE PREPARACIÓN:

Agite cada botella de producto líquido antes de usar. Inserte una aguja de transferencia en la botella de 100 ml de Ingelvac MycoFLEX® 2. Invierta la botella Ingelvac CircoFLEX® 1 sobre la de Ingelvac MycoFLEX® 2. Transfiera todo el contenido de la vacuna a la botella Ingelvac MycoFLEX® 2 a través de la aguja de transferencia y agite suavemente. Retire la botella Ingelvac CircoFLEX® 1 e inserte lentamente la punta de la aguja de transferencia en la botella de vacuna Ingelvac PRRS® MLV 3. Transfiera una porción de la vacuna mixta del frasco Ingelvac MycoFLEX® 2 al frasco Ingelvac PRRS® MLV 3. La cantidad transferida debe ser suficiente para rehidratar el producto Ingelvac PRRS® MLV 3. Voltee las botellas Ingelvac PRRS® MLV 3 e Ingelvac MycoFLEX® 2, aún unidas mediante una aguja de transferencia, para volver a transferir el producto rehidratado a la botella Ingelvac MycoFLEX® 2. Agite bien y use de inmediato. Rehidrate solo con las vacunas que lo acompañan, no mezcle otros materiales.

